



---

## Preparacion para la Videocolonoscopia Barexkit

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de este estudio, está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación

Deberá traer al momento del estudio:

- Carnet de su cobertura de salud
- Fotocopia de Carnet de su cobertura de salud
- Orden autorizada de la práctica
- Estudios previos
- Consentimiento informado firmado y completo el cuestionario de paciente.

48 HS ANTES DEL ESTUDIO NO PUEDE INGERIR FRUTAS, VERDURAS, SEMILLAS, CEREALES NI LACTEOS

### INDICACIÓN DÍA ANTERIOR

- **10:00 HORAS DESAYUNO**

Horas Te + galletas de agua.

PUEDE Y DEBE tomar líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

- **12 HORAS ALMUERZO**

carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). Ésta es la última comida sólida antes del examen.

- **16 HORAS MERIENDA**

Te + galletas de agua.

- **22 HORAS**

Tome cuatro comprimidos de Bisacodilo (incluidos en el Barex Kit) con un vaso de agua, sin masticarlos.

Después de tomar los comprimidos de Bisacodilo, puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, Gato rade de pomelo, caldos colados, mate, té).

- **23 HORAS**



Prepare el Barex contenido en el Kit (2 frascos con polvo para reconstruir 1 litro de solución con cada uno), de acuerdo a las instrucciones del envase original. Colóquelo en la heladera y resérvelo para iniciar la ingesta por la MAÑANA.

## INDICACIÓN DÍA DEL ESTUDIO

- **8:00 HORAS**

Comience a ingerir el Barex, tomando un vaso grande (de aproximadamente 200 cm<sup>3</sup>) cada 15 minutos, hasta completar la totalidad de la solución (2 litros). Es mejor ingerir el vaso completo, rápidamente, en lugar de tomar pequeñas cantidades en forma continua.

### RECUERDE!

DEBE tomar abundantes líquidos, no lácteos (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

- No es necesario suspender ningún tipo de medicación excepto el HIERRO.
- Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.
- Si está tomando medicación antiagregante o anticoagulante (ver drogas -principios activos – citados a continuación) debe consultar con su médico clínico, cardiólogo o hematólogo que indique por ESCRITO cuando suspenderla y cuando reincorporarla luego del estudio. Y si usted se encuentra apto para realizar estudios diagnósticos y/o terapéuticos.

#### ANTIAGREGANTES

ASPIRINA  
CLOPIDOGREL  
PRASUGREL

#### ANTICOAGULANTES

WARFARINA  
ACENOCUMAROL  
RIVAROXABAN  
DABIGATRAN

#### OTROS ANTIAGREGANTES

TICLOPIDINA  
DIPIRIDAMOL  
TIROFIBAN  
EPTIFIBATIDE  
ABCIXIMAB

- No podrá conducir vehículos ni maquinarias y no podrá realizar tareas de responsabilidad ni tomar decisiones importantes luego del estudio por lo que deberá concurrir acompañado.
- Si usted sufre de constipación o tiene colostomía (ano contra natura) o sabe que presenta una anatomía diferente, debe consultar a su médico o a nuestro equipo para adecuar la preparación a su caso.