



ENTEROSCOPIA – PREPARACIÓN

BAREX KIT - MAÑANA

Debe tenerse en cuenta que el buen resultado de este estudio, está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación

Deberá traer al momento del estudio: Carnet de su cobertura de salud, Fotocopia de Carnet de su cobertura de salud, Orden autorizada de la práctica, Estudios previos, Consentimiento informado firmado y completo el cuestionario de paciente.

48 HS ANTES DEL ESTUDIO NO PUEDE INGERIR FRUTAS, VERDURAS, SEMILLAS, CEREALES NI LACTEOS

INDICACIÓN DÍA ANTERIOR

8 HORAS Comience con **40 gotas de FACTOR AG PEDIÁTRICO** (SIMETICONA EN GOTAS) CADA 8 HS EN UN VASO DE AGUA **HASTA LAS 7 HS DEL DÍA DEL ESTUDIO**

10 HORAS Prepare el **Barex** contenido en el Kit (2 frascos con polvo para reconstruir 1 litro de solución con cada uno), de acuerdo a las instrucciones del envase original. **Colóquelo en la heladera y resérvelo para iniciar la ingesta por la noche.**

PUEDE Y DEBE tomar líquidos, **no lácteos** (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 2 horas antes del estudio.

12 HORAS ALMUERZO: carnes rojas o blancas solas. Gelatina de frutas (que no sea de color rojo). **Ésta es la última comida sólida antes del examen.**

16 HORAS Tome cuatro comprimidos de **Bisacodilo** (incluidos en el Barex Kit) con un vaso de agua, sin masticarlos. Después de tomar los comprimidos de Bisacodilo, puede tomar la cantidad de líquidos claros no gasificados que desee (agua mineral, aguas saborizadas, caldos colados, mate, té).

21 HORAS Comience a ingerir el **Barex**, tomando un vaso grande (de aproximadamente 200 cm3) cada 15 minutos, hasta completar la totalidad de la solución (2 litros). Es mejor ingerir el vaso completo, rápidamente, en lugar de tomar pequeñas cantidades en forma continua

CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE



DEBE tomar líquidos, **no lácteos** (Te, mate, café, aguas saborizadas y caldos bien colados y gelatinas) todo lo que desee hasta 4 horas antes del estudio.

- No es necesario suspender ningún tipo de medicación excepto el HIERRO.
- Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar previamente a su médico de cabecera.
- Si está tomando medicación antiagregante o anticoagulante (ver drogas - principios activos – citados a continuación) debe consultar con **su médico clínico, cardiólogo o hematólogo** que indique por ESCRITO cuando suspenderla y cuando reincorporarla luego del estudio. Y si usted se encuentra apto para realizar estudios diagnósticos y/o terapéuticos.

ANTIAGREGANTES	ANTICOAGULANTES	OTROS ANTIAGREGANTES
ASPIRINA	WARFARINA	TICLOPIDINA
CLOPIDOGREL	ACENOCUMAROL	DIPIRIDAMOL
PRASUGREL	RIVAROXABAN	TIROFIBAN
	DABIGATRAN	EPTIFIBATIDE
		ABCIXIMAB

- No podrá conducir vehículos ni maquinarias y no podrá realizar tareas de responsabilidad ni tomar decisiones importantes luego del estudio por lo que deberá concurrir acompañado.
- Si usted sufre de constipación o tiene colostomía (ano contra natura) o sabe que presenta una anatomía diferente, debe consultar a su médico o a nuestro equipo para adecuar la preparación a su caso.