



UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIA

VIDEOCAPSULA – CONSENTIMIENTO INFORMADO

¿Qué es la Videocápsula para el estudio del Intestino delgado?

La **Videocápsula para el estudio del Intestino delgado** le permite al médico examinar el revestimiento de la parte media del tracto digestivo que incluye las tres partes del intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon).

Su médico le dará una cámara de vídeo del tamaño de una píldora para que la trague. Esta cámara tiene su propia fuente luminosa y toma imágenes de su intestino delgado a medida que lo recorre. Estas imágenes son enviadas a un pequeño dispositivo de grabación que usted lleva sobre su cuerpo.

Su médico podrá visualizar estas imágenes con posterioridad y brindarle información útil referida a su intestino delgado. Puede escuchar a su médico o demás personal médico referirse a la endoscopia capsular como endoscopia del intestino delgado, enteroscopia por cápsula o endoscopia inalámbrica.

¿Por qué se realiza la para el estudio del Intestino delgado?

La endoscopia capsular ayuda al médico a evaluar el intestino delgado. Ni la endoscopia superior tradicional ni la colonoscopia alcanzan esta parte del intestino. El motivo más común para realizar la endoscopia capsular es buscar la causa de sangrado en el intestino delgado. También puede ser útil para detectar pólipos, enfermedades inflamatorias del intestino (enfermedad de Crohn), úlceras y tumores del intestino delgado. Al igual que con la mayoría de los procedimientos nuevos de diagnóstico, actualmente no todas las compañías de seguros realizan reembolsos por este procedimiento. Usted puede tener que verificar con su propia compañía de seguros para asegurarse si cubre este beneficio.

¿Cómo debo prepararme para este procedimiento?

El estómago vacío permite un examen mejor y más seguro, por lo que no debe comer ni beber nada, incluyendo agua, durante aproximadamente doce horas antes del examen. El médico le dirá cuándo comenzar el ayuno. Dígame anticipadamente a su médico todos los medicamentos que toma, incluyendo hierro, aspirina, productos de subsalicilato de bismuto y otros medicamentos que puedan comprarse sin receta médica. Puede ser necesario que ajuste la dosis habitual antes del examen. Discuta las alergias a los medicamentos además de las enfermedades médicas, tales como alteraciones en la deglución y enfermedades cardíacas o pulmonares. Dígame a su médico si tiene marcapasos o desfibrilador, cirugía abdominal previa, antecedentes de obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria de los intestinos o



adherencias. Su médico podrá pedirle que realice una preparación o limpieza de los intestinos antes del estudio.

¿Qué puedo esperar durante la para el estudio del Intestino delgado?

El médico lo preparará para el examen aplicándole un sensor en su abdomen mediante mangas adhesivas (similares a cintas). La cápsula endoscópica se traga y pasa de modo natural a través del tubo digestivo a la vez que transmite imágenes de vídeo a una grabadora de datos que se usa en el cinturón durante aproximadamente ocho horas. Al final del procedimiento, volverá al consultorio y se le quitará la grabadora, de modo que las imágenes de su intestino delgado se puedan ver en una pantalla de computadora para que el médico las examine. La mayoría de los pacientes consideran que esta prueba es cómoda. La cápsula endoscópica tiene el tamaño aproximado de una píldora grande. Después de ingerir la cápsula y hasta excretarla, no debe acercarse a un dispositivo de resonancia magnética nuclear (RMN) ni programar una RMN.

¿Qué pasa después de la Videocápsula?

Podrá tomar líquidos después de dos horas y tomar una comida liviana después de cuatro horas desde la ingestión de la cápsula, a menos que su médico le indique lo contrario. Deberá evitar toda actividad física pesada, tal como correr o saltar durante el estudio. Por lo general, el médico puede decirle los resultados de la prueba una semana después del procedimiento, sin embargo, los resultados de algunas pruebas pueden tomar más tiempo.

¿Cuáles son las posibles complicaciones de la Videocápsula?

Si bien puede haber complicaciones, no son frecuentes cuando el médico que realiza esta prueba está capacitado y tiene experiencia en el procedimiento. Existe un riesgo potencial de que la cápsula quede atascada en algún lugar estrecho del tubo digestivo, causando obstrucción intestinal. Por lo general, esto se relaciona con una estenosis (estrechamiento) del tubo digestivo debido a una inflamación, una cirugía anterior o un tumor. Es importante reconocer una obstrucción de manera temprana. Si tiene signos de obstrucción, tales como hinchazón inusual, dolor abdominal, náuseas o vómitos, llame a su médico de inmediato. Además, si tiene fiebre después de la prueba, problemas para tragar o dolor torácico, dígaselo a su médico de inmediato. Tenga cuidado de no desconectar el sistema de modo prematuro ya que esto puede causar la pérdida de imágenes que se envían al dispositivo de grabación de datos.

RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información tiene como único fin proporcionar pautas generales y no ofrece una opinión médica definitiva. Es muy importante que consulte con su médico acerca de su enfermedad específica.



Consentimiento de Endocápsula.

Autorizo al Dr..... MP.....a realizar la endocápsula. Se me ha facilitado la información previamente al procedimiento, se me ha explicado y he comprendido los beneficios y riesgos de dicho procedimiento. He recibido respuestas a todas mis dudas, habiendo tomado la decisión libre y voluntariamente.

Paciente:

Firma y aclaración:..... DNI:

Familiar o testigo:

Firma y aclaración:DNI:

Médico:

Firma y sello:

Lugar y fecha.....